

Risk Indicators for Hearing Loss Checklist

(To be used with the **Developmental Scales** form when performing KBH screens for birth through four years of age.)

Child's name: _____ Birthdate: _____

What was your child's birth weight? _____ Premature? _____ By how many weeks? _____

Was the child's hearing screened as a newborn? Yes ____ No ____ Unknown ____

Results of the testing/screening: _____

Has your child's hearing been tested or screened since birth? Yes ____ No ____ Unknown ____

Results of the testing/screening: _____

Directions: Mark an X in the appropriate column. If an indicator exists but has been referred in a previous screening, note to whom the child was referred and note the follow-up recommendations.

{N = indicator for infants birth through 28 days old who *did not* have newborn hearing screening; for children older than 28 days, answer all questions.}

YES NO

____ ____ 1. Do you have a concern about your child's hearing, speech, language or other development delay?
List concerns: _____

____ ____ 2. **N** As a newborn, did your child have an illness/condition requiring 48 hours or more in the NICU?
Explain: _____

____ ____ 3. **N** Was your child exposed to any of the following during the mother's pregnancy? Check all that apply:
toxoplasmosis syphilis rubella cytomegalovirus herpes unknown

____ ____ 4. **N** Does your child have any abnormal features of the outer ear, ear canal, mouth, nose, neck or head?
Explain: _____

____ ____ 5. **N** Have any of your child's relatives had a permanent hearing loss before the age of 5?
Explain: _____

____ ____ 6. **N** Was your child diagnosed at birth as having a syndrome or condition known to include a sensorineural or conductive hearing loss or eustachian tube dysfunction?
Explain: _____

____ ____ 7. Has your child been diagnosed as having any syndromes associated with progressive hearing loss such as Down, Usher, Waardenburg; a neurodegenerative disorder such as Hunter syndrome; or sensory motor neuropathies such as Friedreich's ataxia or Charcot-Maire-Tooth Syndrome?
Explain: _____

____ ____ 8. Has your child had bacterial meningitis (or other postnatal infections) associated with hearing loss?
If yes, at what age? _____ Hearing testing since then? _____

____ ____ 9. Has child ever had any head trauma?
Explain: _____

____ ____ 10. As a newborn, did your child need an exchange transfusion because of hyperbilirubinemia, or have the need for mechanical ventilation, or conditions requiring ECMO?
Explain: _____

____ ____ 11. Has your child had otitis media with effusion that lasts for more than 3 months? Yes ____ No ____
If yes, were tubes placed? Yes ____ No ____ If yes, when? _____ Are they in place now? Yes ____ No ____

Note: The presence of any risk indicator denotes need for screening every six months up to three years of age or as otherwise indicated by an audiologist.

Pass = All "NO" responses. Refer = One or more "YES" response(s). **Check One: Pass** **Refer**

If other, explain: _____

Screener: _____ **Date:** _____

PLEASE NOTE PROVIDERS ARE REQUIRED TO INTERPRET AND INITIATE CARE WHEN INDICATED.

LISTA DE INDICADORES DE RIESGO DE LA PÉRDIDA DE OÍDO

(Para uso con forma de escalas de desarrollo cuando haga chequeo de KBH de nacimiento a cuatro años de edad.)

NOMBRE DEL NIÑO(A): _____ FECHA DE NACIMIENTO: _____

¿Cuál era el peso de nacimiento de su niño(a)? _____ ¿Fue prematuro(a)? _____ ¿Por cuantas semanas? _____

¿De recién nacido(a), se le hizo examen de oído a su niño(a)? Sí _____ No _____ Desconocido _____

Resultados del examen _____

¿Después de nacimiento, se le ha hecho un examen de oído a su niño(a)? Sí _____ No _____ Desconocido _____

Resultados del examen _____

Nombre del doctor primario del niño: _____

Instrucciones: Marque una X en la columna apropiada. Si un indicador existe pero ha sido referido en un examen previo, anote a quién refirieron a el niño(a) y anote las recomendaciones de seguimiento.

[N = indicador para infantes de nacimiento a 28 días de nacido quienes *no* tuvieron examen de oído de recién nacidos. Para niños mayores de 28 días, conteste todas las preguntas.]

SÍ NO

- | | | | | | | | | | |
|-----------------|---------|-------------|---|---------------|---------|---------|-----------------|--------|-------------|
| _____ | _____ | 1. | ¿Tiene una preocupación sobre la audición, el habla, lenguaje o retraso de desarrollo de su niño(a)?
Escriba preocupaciones: _____ | | | | | | |
| _____ | _____ | 2. | ¿De recién nacido, tuvo su niño(a) una enfermedad/condición que requiriera 48 horas o más en la Unidad de Cuidado Intensivo de Recién Nacidos? Explique: _____ | | | | | | |
| _____ | _____ | 3. | ¿Fue el niño(a) expuesto a cualquiera de los siguientes durante el embarazo de la madre? Marque todos que apliquen:
<table style="margin-left: 20px; border: none;"> <tr> <td style="padding-right: 20px;">toxoplasmosis</td> <td style="padding-right: 20px;">sífilis</td> <td>rubéola</td> </tr> <tr> <td>citomegalovirus</td> <td>herpes</td> <td>desconocido</td> </tr> </table> | toxoplasmosis | sífilis | rubéola | citomegalovirus | herpes | desconocido |
| toxoplasmosis | sífilis | rubéola | | | | | | | |
| citomegalovirus | herpes | desconocido | | | | | | | |
| _____ | _____ | 4. | ¿Tiene su niño(a) partes anormales del oído externo, canal del oído, boca, nariz, cuello, o cabeza?
Explique: _____ | | | | | | |
| _____ | _____ | 5. | ¿Algún pariente de su niño(a) tuvo pérdida del oído permanente antes de la edad de 5 años?
Explique: _____ | | | | | | |
| _____ | _____ | 6. | ¿Al nacer, fue su niño(a) diagnosticado(a) con un síndrome o condición conocida a incluir una sordera neurosensorial o conductiva o Disfunción de la Trompa de Eustaquio?
Explique: _____ | | | | | | |
| _____ | _____ | 7. | ¿Ha sido diagnosticado su niño(a) con cualquier síndrome asociado con sordera progresiva tal como Down, Usher, Waardenburg; un desorden neurodegenerativo tal como el Síndrome de Hunter; o neuropatías sensorimotoras tal como Friedrich's ataxia o síndrome Charcot-Marie-Tooth?
Explique: _____ | | | | | | |
| _____ | _____ | 8. | ¿Ha tenido su niño(a) bacteria meningitis (u otras infecciones pos-natales) asociadas con sordera? ¿Si sí, a qué edad?
Examen de audición desde entonces? _____ | | | | | | |
| _____ | _____ | 9. | ¿Alguna vez el niño(a) ha tenido algún trauma de cabeza?
Explique: _____ | | | | | | |
| _____ | _____ | 10. | ¿De recién nacido, tuvo su niño(a) un cambio transfusión a causa de hiperbilirrubinemia, o tiene la necesidad de ventilación mecánica, o condiciones que requieren la Oxigenación por Membrana Extracorpórea?
Explique: _____ | | | | | | |
| _____ | _____ | 11. | Ha tenido su niño(a) otitis media con efusión que dure más de 3 meses? Sí _____ No _____
¿Si sí, le pusieron tubos? Sí _____ No _____ ¿Si sí, cuando? _____
¿Los tiene puestos ahora? Sí _____ No _____ | | | | | | |

Nota: La presencia de cualquier indicador de riesgo denota lo necesidad a un examen cada 6 meses hasta la edad de 3 años, o de otra manera indicado por el audiólogo.

Pasó = Todas respuestas "NO" Referir = Una o más "SÍ" respuestas

Marque Uno: Pasó Referir **Si otro, explique:** _____

Proveedor que hizo el chequeo: _____ **Fecha:** _____